

PRISE DE MÉDICAMENTS



Pour le plupart des dosages, il convient de ne pas changer le traitement du patient. Cependant certaines analyses nécessitent l'arrêt de certains médicaments.

En cas de doute, contactez le laboratoire.



Analyses soumises à des interférences médicamenteuses (liste non exhaustive, se référer au manuel de prélèvement) :

Analyses	Médicaments interférants
Aldostérone	Spironolactone, Autres diurétiques, Oestrogènes, IEC, AINS, Béta-bloquants, Inhibiteurs des canaux calciques
Analyses bactériologiques et mycologiques	Antibiotiques et antifongiques
Anticoagulant circulant	Héparine, Anticoagulants oraux directs
Antithrombine	Héparine, Oestrogènes ...
Cortisol	Corticothérapie
Créatine Kinase	Injection IM
D-dimères	Thrombolytiques
Electrophorèse des protéines	Produits de contraste iodé
G6PD et pyruvate kinase	Transfusion sanguine
Hémostase	Traitement anticoagulant
Protéine C, Protéine S	Arrêt 1 mois pour AVK, à distance d'un traitement par anticoagulant direct actif par voie orale
Rénine	Spironolactone, Autres diurétiques, IEC, ARAII, Béta-bloquants, Aliskirène
Test respiratoire Helicobacter pylori	Antibiotiques, IPP, anti-acides, pansements gastriques

T4L	Levothyrox (réaliser le dosage avant la prise)
Nombreuses analyses	Qizenday et autres médicaments contenant de la biotine

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI